

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

10
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

D.L.P. 21-6-72 463810

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE" TÉL. RENNES (99) 36-01-74

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux, Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 141

15 JUIN 1972

POMMIER - POIRIER

CARPOCAPSE - Jusqu'à présent, les conditions climatiques n'ont pas été favorables à cet insecte qui a besoin de températures relativement élevées pour être très actif.

Cependant, quelques pontes ont été enregistrées récemment. L'éclosion se produira au plus tôt le 20 ou le 21 juin.

Pour éviter les premières attaques de ce ver des fruits, il y a lieu d'exécuter un traitement dans le courant de la semaine prochaine.

Pour cette première application, utiliser de préférence l'arséniac de plomb.

TAVELURE - Profiter du traitement insecticide indiqué ci-dessus pour maintenir la protection des arbres contre la tavelure qui a trouvé des conditions très favorables à son extension, du fait des pluies fréquentes.

POMME DE TERRE

MILDIOU - Cette maladie risque d'occasionner de graves dommages aux cultures de pommes de terre de semence et de conservation au cours de cette campagne si aucune mesure n'est prise dans les meilleurs délais pour empêcher son extension.

En effet, actuellement de nombreux foyers existent dans diverses cultures des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et surtout du Finistère, et de nouvelles taches vont apparaître sans tarder. La quantité de germes susceptibles de provoquer des contaminations deviendra très élevée alors que beaucoup de cultures n'ont pu encore être protégées en raison d'un excès d'humidité.

Il est donc indispensable d'effectuer un premier traitement dès que possible dans ces cultures et de renouveler la protection dans celles dont le dernier traitement remonte à une semaine ou plus.

Compte tenu du danger actuel, et notamment si des chutes de pluie se produisaient à nouveau, il est prudent d'augmenter d'environ 50 % les doses de fongicides normalement conseillées.

Nous rappelons qu'un traitement perd son efficacité si une pluie, même faible, tombe dans les heures qui suivent la pulvérisation. Il convient alors de le renouveler au plus tôt.

ECHALOTE - OIGNON

MILDIOU - Effectuer un nouveau traitement suivant les indications contenues dans notre bulletin du 24 mai.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

G. PAITIER et G. CHARPENTIER

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
Phytosanitaire "Bretagne"

J. DELOUSTAL

Dernière note : Bulletin N° 141 du 7 juin 1972